

## 性病


-1-

疾病	义务检查	诊断	可能的症候
淋病	要去 每六个星期	涂片检查  尿检 	黄色, 臭的从阴茎, 阴道或者肛门流出的白带  排尿时有疼, 痒痒或者烧灼感  口交以后有喉痛
梅毒	要去 每十二个星期	血液化验 	在阴茎, 阴道, 肛门或者咽喉的结节和溃疡 肿大的淋巴结, 皮疹
HIV 病毒/ 艾滋病	要去 每十二个星期	血液化验 	经常比较长的时间 没有症候
衣原体感染	没有	涂片检查  尿检 	黄色, 臭的从阴茎, 阴道或者肛门流出的白带  排尿时有疼, 痒痒或者烧灼感  口交以后有喉痛  性交时疼
乙型肝炎和 丙型肝炎	没有	血液化验 	经常没有症候 黄胆病

### 重要的信息

- 感染淋病, 梅毒或 HIV 阳性时, 健康手册是没收的。
- 除了定期检查以外, 也要做妇科检查。定期检查不包括宫颈涂片(妇科医生= Frauenarzt/-ärztin, GynäkologIn)。对男生附加泌尿科检查很重要(UrologIn=泌尿科医生)。推荐: 至少检查每年一次, 例如 [www.docfinder.at](http://www.docfinder.at)
- 有任何症状, 请去看病!
- 在奥地利有很好的方法治疗这些性病。
- 有些性病必要伴侣也接受治疗。
- 有付费乙型肝炎和子宫颈癌的预防针。请医生给你说明!


## 传染途径和保护措施

传染途径	潜在的疾病	预防性病的保护措施
阴道性交 	HIV 病毒, 梅毒, 乙型肝炎和丙型肝炎, 淋病, 衣原体感染	避孕套 
肛交 	HIV 病毒, 梅毒, 乙型肝炎和丙型肝炎, 淋病, 衣原体感染	避孕套
口交 	HIV 病毒, 梅毒, 乙型肝炎和丙型肝炎, 淋病, 衣原体感染	避孕套, 口交巾保护  
吻 	梅毒, 乙型肝炎	不吻  
手, 情趣用品 	梅毒, 淋病, 衣原体感染	避孕套, 胶乳手套, 口交巾保护   
血液 	HIV 病毒, 乙型肝炎和丙型肝炎	避孕套, 胶乳手套, 不接触血液   

对女人还是男人做口交无防护物 = 有感染风险!!! (例如梅毒, 人类乳头瘤病毒, 等)

### 正确使用避孕套:

- 把避孕套套在阴茎前, 阴茎应该是勃起的!
- 将阴茎前的包皮腿上去, 用指头把避孕套的顶端抓住, 这样开始把避孕套套在阴茎。
- 把避孕套向下套时, 用指头抓住避孕套的顶端!
- 总是把避孕套直套到阴茎底!
- 射精以后把阴茎即刻地抽离, 不要等阴茎换到软状态!



有问题的话, 请求助于性服务者的咨询中心! 在哪儿可以获的帮助和咨询, 是免费和保密的! 地址请看手册《性工作信息》! 这个手册可以得到在奥地利的健康局作。

避孕方法	机械的		激素的	化学的		自然的
避孕工具	♂ ○ 避孕套	♀ ○ 隔膜 ○ 避孕宫颈帽 ○ 等.	♀ ○ 避孕片 ○ 狄波-普维拉 (每三个月大针) ○ 避孕贴 ○ 激素的子宫环 ○ 阴道环 ○ 囊假体	♀ ○ 铜的子宫环	♀ ○ 桩剂 ○ 霜 ○ 药片	♀ ○ 测体温 ○ 观测黏液的方法 ○ 日历
说明	阴道性交前，把避孕套戴在上勃起的阴茎。  保护怀孕和性病的传染。	阴道性交前，镶入在阴道，子宫口的前面。  保护精液到子宫。	可以在妇科医生买到。  为防止怀孕机会通过身体里的激素变化	被妇科医生插入在子宫。  防止受精卵子的着床。  被妇科医生取出的。要换每三四年。	阴道性交前，插入在阴道。  杀精子避孕药。.	分辨肥沃和不肥沃的天。  肥沃天时，必要使用另一个避孕工具，例如避孕套。
怎么和在哪儿可以买到？	○ 性商店 ○ 超市 ○ 妇女用品商店 ○ 药店	○ 去看妇科医生是推荐的 ○ 药店	○ 必要去看妇科医生	○ 必要去看妇科医生	○ 药店	
保护 - 正确使用时！	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
性病的保护	保护	不保护	不保护	不保护	不保护	不保护

“紧急避孕药” – 只在紧急情况使用：没有防护的阴道性时，要吃紧急避孕药至迟 72 个小时以后。是非处方的，可以在药店和妇科的门诊部 (在医院) 买到。紧急避孕药不保护性病，HIV 和艾滋病传染！

海绵：不保护性病，HIV 病毒和艾滋病传染，也不防止怀孕。