

















POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY























Nemoc	Povinná kontrola	Diagnóza	Možné příznaky nemocí
Kapavka (Tripl)	Ano Každých 6 týdnů	Cytologický stěr  Vyšetření moči 	 Žlutavý, páchnoucí výtok z penisu, pochvy nebo řitního otvoru  Bolest či pálení při močení  Bolest v krku po orálním styku
Syfilis (Lues, Příjice)	Ano Každých 12 týdnů	Vyšetření krve 	 Uzle nebo vředy na penisu, pochvě, řitního otvoru nebo v ústech/hltanu Zvětšené mízní uzliny, vyrážka
HIV/AIDS	Ano Každých 12 týdnů	Vyšetření krve 	Často dlouhou dobu žádné příznaky
Chlamýdie	Ne	Cytologický stěr  Vyšetření moči 	 Žlutavý, páchnoucí výtok z penisu, pochvy nebo řitního otvoru  Bolest či pálení při močení  Bolest v krku po orálním styku  Bolest při pohlavním styku
Hepatitida B nebo C (nakažlivý zánět jater)	Ne	Vyšetření krve 	 Často žádné příznaky Žloutenka

Důležité odkazy:

- Při nemoci kapavky, syfilisu nebo HIV Vám bude odebrána zdravotní knížka (karta).
- Gynekologické vyšetření jsou dodatečně potřebné! Předepsaná vyšetření nezahrnují např. stěr na rakovinu děložního čípku. Pro muže jsou dodatečná urologická vyšetření (u urologa) důležitá. Doporučení: nejméně každoroční kontrola; např. www.docfinder.at
- U všech příznaků nemoci vyhledejte prosím doktora!
- V Rakousku existují velmi dobré možnosti ošetření těchto nemocí.
- Některé nemoce vyžadují ošetření partnera!
- Proti Hepatitidě B a HPV existuje placené očkování. Zeptejte se Vašeho doktora

MOŽNOSTI PŘENOSU A OCHRANA


-1-

Přenos	Možné nemoce	Ochrana před nákazou
Vaginální styk 	HIV, Syfilis, Hepatitida B a C, Kapavka, Chlamýdie	Kondom 
Anální styk  	HIV, Syfilis, Hepatitida B a C, Kapavka, Chlamýdie	Kondom 
Orální styk  	HIV, Syfilis, Hepatitida B a C, Kapavka, Chlamýdie	Kondom, latexová ústní rouška  
Libání  	Syfilis, Hepatitida B	Žádné libání  
Ruka, erotické pomůcky  	Syfilis, Kapavka, Chlamýdie	Kondom, latexová ústní rouška, latexové rukavice   
Krev 	HIV, Hepatitida B a C	Kondom, latexové rukavice, kontakt s krví   

Orální sex bez ochrany = riziko nákazy!!! (např. Syfilis, HPV,...)

Správné použití kondomu:

- Při natáhnutí kondomu musí penis být ztupořený!
- Předkožku stáhnout zpět, špičku kondomu potlačit a takto nasadit na penis.
- Při svléknutí kondomu vždy držet špičku kondomu!
- Vždy odrolovat kondom přes penis až do jeho konce!
- Vytáhnout penis z pochvy ihned po ejakulaci, dokud je penis ztupořený!



Mate-li otázky, obraťte se na poradny pro lidi pracující v sexbyznysu! Zde dostanete bezplatně a důvěrně radu i podporu. Adresy najdete v brožurě „Sexwork-Info“! Tuto brožuru dostanete např. v rakouských zdravotních úřadech!

TĚHOTENSTVÍ – PŘEHLED ANTIKONCEPČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Metody	Bariérové		Hormonální	Chemické		Přírodní
Antikoncepční prostředky	♂	♀	♀	♀	♀	♀
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kondom 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diafragma ○ Cervikální klobouček ○ atd. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pilulka ○ Tříměsíční injekce ○ Náplast ○ Nitroděložní tělísko ○ Vaginální kroužek ○ Podkožní implantát 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nehormonální nitroděložní tělísko 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Čípky ○ Krémy ○ Tablety 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Teplotní metoda ○ Hlenová metoda ○ Kalendářová metoda
Popis	<p>Před stykem přetáhnout přes ztopořený penis.</p> <p>Zabraňuje těhotenství a infekci s pohlavně přenosnými chorobami.</p>	<p>Před stykem vložit do pochvy před děložní hrdlo.</p> <p>Zabraňuje posunu spermií do dělohy.</p>	<p>K dostání u gynekologa.</p> <p>Hormonální změny v těle zabraňují možnost těhotenství.</p>	<p>Zasazená do dělohy od gynekologa.</p> <p>Zabraňuje uhnízdění oplodněného vajíčka.</p> <p>Odstranění možné jen gynekologem.</p> <p>Výměna po 3-5 letech.</p>	<p>Před stykem zavést do pochvy.</p> <p>Zabíjí spermie.</p>	<p>Určení plodných a neplodných dnů.</p> <p>Při plodných dnech je dodatečná antikoncepce nutná, např. kondom.</p>
Jak a kde k dispozici?	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sexshop ○ Supermarket ○ Drogerie ○ Lékárna 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Doporučí se návštěva u gynekologa ○ Lékárna 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Návštěva u gynekologa je nutná 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Návštěva u gynekologa je nutná 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lékárna 	
Bezpečnost při SPRÁVNÉM použití	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Ochrana před pohlavně přenosnou nemocí	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Tabletka „následujícího rána“ – jen v nouzové situaci: užít nejpozději do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku - je k dostání bez nutnosti lékařského předpisu v lékárnách a gynekologických ambulacích (v nemocnici). **Nechrání** před pohlavně přenosnými chorobami a HIV/AIDS!

Houbičky – Menstruační tampony – Soft-Tampons: **nechrání** před pohlavně přenosnými chorobami a HIV/AIDS, **taky nechrání** před těhotenstvím!

Vydavatel: Pracovní družstvo prostituce v rámci Task Force obchod s lidmi. Všechny informace v této publikaci následují navzdory pečlivě úpravě bez záruky. Odpovědnost vydavatele je vyloučena.

Obrazové úvěry: S laskavým svolením a podporou Spolkového střediska pro zdravotní výchovu/ Německo (www.bzga.de).